



Les Rencontres du **Végétal**

8^e édition

12-13 JANVIER 2015
AGROCAMPUS OUEST
ANGERS, FRANCE

RECHERCHE
EXPÉRIMENTATION
INNOVATION
.....

Fruits
Légumes
Ornement
Plantes aromatiques
et médicinales
Semences
Cidriculture
Viticulture
Paysage

**Impact d'infrastructures agro-écologiques
sur la régulation naturelle de deux
ravageurs majeurs du pommier cidricole
dans le cadre d'un essai système.**

Session : Services écosystémiques et végétal spécialisé, de la production
au cadre de vie.

12 janvier 2015

Laurence ALBERT
Ingénieure d'expérimentation IFPC

CONTEXTE



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉCOPHYTO

RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Diminuer usage de produits
phytosanitaires



Favoriser la régulation
naturelle



Filière pomme à cidre



UNICID

- Variétés rigoureuses

- Récolte mécanisée au sol

- Fruits transformés



**Volonté des professionnels de développer
des systèmes de production durable**

Projet CASDAR 2012- 2014 Verger Cidricole de Demain : concevoir,
expérimenter et évaluer des nouveaux systèmes en verger cidricole



Impact d'infrastructures agro-écologiques sur la régulation naturelle de deux ravageurs
majeurs du pommier cidricole dans le cadre d'un essai système - L. ALBERT - IFPC

12 janvier 2015

VERGER CIDRICOLE DE DEMAIN...



... est un projet **multi-partenaires**,

- Des chambres d'agriculture,
- Des coopératives,
- Des conseils privés,
- Des instituts techniques,
- Des lycées agricoles,
- Des organismes de recherche,
- Des producteurs...





Impact d'infrastructures agro-écologiques sur la régulation naturelle de deux ravageurs majeurs du pommier cidricole dans le cadre d'un essai système - L. ALBERT - IFPC

12 janvier 2015

VERGER CIDRICOLE DE DEMAIN...




... est un projet **multi-partenaires**, mis en place exclusivement chez des **producteurs** du réseau,



Bassins de production de pomme à cidre


VERGER CIDRICOLE DE DEMAIN...

... est un projet **multi-partenaires**, mis en place exclusivement chez des **producteurs** du réseau, dans lequel des techniques **innovantes** (fertilisation, irrigation, IAE...) sont étudiées selon une **approche système**.



VERGER CIDRICOLE DE DEMAIN...

... est un projet **multi-partenaires**, mis en place exclusivement chez des **producteurs** du réseau, dans lequel des techniques **innovantes** (fertilisation, irrigation, IAE...) sont étudiées selon une **approche système**.



PROBLEMATIQUE

Existe-t-il une différence en quantité et diversité spécifique des auxiliaires présents dans les deux systèmes de production ECO et PROD ?



Si oui, quel est le rôle joué par les aménagements agro-écologiques mis en place sur la structure et la diversité des communautés d'auxiliaires observés ?



La régulation naturelle des ravageurs est-elle alors favorisée ?




SUIVIS BIODIVERSITE REALISES EN 2013

Strate étudiée	Technique	Lieu de capture	Ravageurs ciblés
Sol 	Pot barber 	Inter-rang et IAE	Pucerons, larves de carpocapses...
Strate herbacée (Bande fleurie et inter-rang) 	Filet fauchoir et aspirateur 	Inter-rang et IAE	Pucerons, œufs de carpocapse, psylles, acariens...
Strate arborée (Pommier et haies) 	Filet fauchoir 	Pommier et IAE	
Suivis spécifiques de foyers de pucerons cendrés 	Œil nu	Pommier	Pucerons cendrés

RESULTATS 2013 : strate du sol

Nombre de carabes capturés en 2013 dans chaque site



→ Significativement plus de carabes dans la modalité ECO que dans la modalité PROD (effet pratiques, type enherbement...)


RESULTATS 2013 : strate du sol

Site	ECO		PROD	
	Nb espèce	Espèce majoritaire (%des individus capturés)	Nb espèce	Espèce majoritaire (%des individus capturés)
14	18	<i>Poecilus cupreus</i> (68 %) <i>Carabus granulatus</i> (16 %)	18	<i>Poecilus cupreus</i> (49 %) <i>Carabus granulatus</i> (34 %)
27	17	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (49 %) <i>Poecilus cupreus</i> (20 %)	20	<i>Poecilus cupreus</i> (34 %) <i>Amara sp</i> (16%)
35	2	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (68 %) <i>Poecilus cupreus</i> (32 %)	4	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (50 %) <i>Harpalus sp</i> (16 %)
53	8	<i>Poecilus cupreus</i> (65 %) <i>Pseudoophonus rufipes</i> (13 %)	8	<i>Poecilus cupreus</i> (71 %) <i>Pterostichus melanarius</i> (12 %)
61	14	<i>Poecilus cupreus</i> (33 %) <i>Brachinus crepitans</i> (19 %)	17	<i>Poecilus cupreus</i> (42%) <i>Brachinus crepitans</i> (20 %)

→ Les communautés de carabes varient d'un site à l'autre et d'une modalité à l'autre, mais les espèces majoritaires sont *Poecilus cupreus* et *Pseudoophonus rufipes*

RESULTATS 2013 : strate herbacée

Familles d'auxiliaires capturés dans les différentes states basses




→ Communauté d'auxiliaires des strates basses varie selon le type d'enherbement et la modalité, mais la bande fleurie semble être un endroit plus favorable pour plusieurs familles d'insectes.


RESULTATS 2013 : strate arborée

ACP sur les individus capturés en 2013 dans les pommiers
(somme sur les dates)

Individuals factor map (PCA)




Variables factor map (PCA)



→ La communauté d'auxiliaires est d'abord structurée par le facteur site.

RESULTATS 2013 : foyers de pucerons cendrés

Evolution temporelle du nombre de pucerons cendrés, larves de syrphes et coccinelles présents dans les foyers de pucerons cendrés



→ Régulation potentielle des pucerons cendrés par les larves de syrphes et coccinelles

RESULTATS 2013 : foyers de pucerons cendrés

Moda	Site	Nb puceron cendré/ foyer	Nb foyers occupés par un stade actif d'auxiliaire au pic	Localisation de la bande fleurie
ECO	14	11		
	27	75		
	35	53		
	61	50		
PROD	14	37		
	27			
	35	68		
	61	85		

RESULTATS 2013 : foyers de pucerons cendrés

Moda	Site	Nb puceron cendré/ foyer	Nb foyers occupés par un stade actif d'auxiliaire au pic	Localisation de la bande fleurie
ECO	14	11	14 %	
	27	75	60 %	
	35	53	20 %	
	61	50	63 %	
PROD	14	37	14 %	
	27		-	
	35	68	46 %	
	61	85	20 %	

RESULTATS 2013 : foyers de pucerons cendrés

Moda	Site	Nb puceron cendré/ foyer	Nb foyers occupés par un stade actif d'auxiliaire au pic	Localisation de la bande fleurie
ECO	14	11	14 %	Un inter-rang sur 2
	27	75	60 %	Sur tous les inter-rangs
	35	53	20 %	En bordure
	61	50	63 %	Sur tous les inter-rangs
PROD	14	37	14 %	
	27			
	35	68	46 %	
	61	85	20 %	

→ Occupation des foyers de pucerons par auxiliaires potentiellement plus forte sur les sites où la bande fleurie est sur tous les inter-rangs

CONCLUSION

Ces premiers résultats :

- Soulignent la difficulté d'identifier les facteurs influençant la biodiversité : facteur région domine ?
- Montrent des réactions différentes des auxiliaires aux pratiques et bandes fleuries : effet plus important sur le sol et strate basse que sur la strate arborée ?
- Semblent confirmer l'importance de la position des bandes fleuries sur la régulation naturelle de ravageur



Travaux à poursuivre...

Projet VDD à travers un projet Casdar 2015-2018

Thèse CIFRE débutée en mars 2014 en partenariat avec l'IFPC, l'INRA et Agrocampus-Ouest



Impact d'infrastructures agro-écologiques sur la régulation naturelle de deux ravageurs majeurs du pommier cidricole dans le cadre d'un essai système - L. ALBERT - IFPC

12 janvier 2015



Merci de votre attention !

